

## TRAUMEEL 50 COMPRIMIDOS

Traumeel Comprimidos se utiliza para las lesiones e inflamaciones musculoesqueléticas, tales como lesiones por sobrecarga, epicondilitis humeral, osteoartritis, derrames o síndrome del túnel carpiano.

Calificación: Sin calificación

**Precio**

15,25 €

15,25 €

0,59 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [LABORATORIOS HEEL](#)

### Descripción

Traumeel Comprimidos se puede combinar con la aplicación local de Traumeel Pomada o Traumeel Gel, para una recuperación rápida y duradera. Los comprimidos de Traumeel se deben disolver en la boca, no deben tragarse.

#### Composición de Traumeel S Comprimidos

Cada comprimido de 301,5 mg contiene: Los principios activos son Arnica D2 15 mg, Calendula D2 15 mg, Hamamelis D2 15 mg, Millefolium D3 15 mg, Belladonna D4 75 mg, Aconitum D3 30 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30 mg, Hepar 5 de 5 sulfuris D8 30 mg, Chamomilla D3 24 mg, Symphytum D8 24 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Echinacea angustifolia D2 6 mg, Echinacea purpurea D2 6 mg, Hypericum D2 3 mg.

Los demás componentes (excipientes) son lactosa y estearato de magnesio

### MODO DE EMPLEO

Forma de administración:

Preferiblemente permitir que el comprimido se disuelva en la boca y después se trague.

Para los niños es posible aplastar el comprimido y agregarle una pequeña cantidad de agua.

Este medicamento debe tomarse separado de las comidas.

La dosis recomendada es:

**Dosificación estándar:**

Adultos y niños de 12 años o más: un comprimido 3 veces al día.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

Niños menores de 2 años: un comprimido una vez al día.

Niños entre 2-5 años: un comprimido 1-2 veces al día.

Niños entre 6-11 años: un comprimido 2 veces al día.

**Dosificación aguda o inicial:**

Adultos y niños de 12 años o más: un comprimido cada ½-1 hora, hasta un máximo de 12 comprimidos al día, y después se continúa con la dosis estándar.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

Niños menores de 2 años: un comprimido cada 1-2 horas, hasta un máximo de 4 comprimidos al día, y después se continúa con la dosis estándar.

Niños entre 2-5 años: un comprimido cada 1-2 horas, hasta un máximo de 6 comprimidos al día, y después se continúa con la dosis estándar.

Niños entre 6-11 años: un comprimido cada 1-2 horas, hasta un máximo de 8 comprimidos al día, y después se continúa con la dosis estándar.

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.