

OSCILLOCOCCINUM BOIRON GLOBULOS 6 ENVASES UNIDOSIS

Medicamento Homeopático

Calificación: Sin calificación

Precio

14,50 €

14,50 €

2,52 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [BOIRON](#)

Descripción

Composición de oscillococcinum envase unidosis para glóbulos

- El principio activo es Anas barbariae.
Cada envase unidosis de 1 g contiene 0,01 ml de Anas barbariae 200 K.
- Los demás componentes (excipientes) son 0,15 g de lactosa y 0,85 g de sacarosa.

MODO DE EMPLEO

La dosis recomendada es:

Prevención: tomar 1 envase unidosis para glóbulos a la semana durante el periodo de exposición gripal (de septiembre a marzo).

Con la aparición de los primeros síntomas, tomar lo antes posible 1 envase unidosis para glóbulos 3 veces al día. Continuar con esta posología mientras se mantengan los síntomas. Si los síntomas empeoran, consultar a su médico.

Dejar disolver los glóbulos debajo de la lengua.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la posología recomendada para niños es la misma que la indicada anteriormente.

En niños menores de 24 meses, disolver el contenido de un envase unidosis en un poco de agua y administrar cuando se haya disuelto completamente.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

Oscillococcinum envase unidosis para glóbulos requiere una posología individualizada. Consultar con su farmacéutico o médico formado en homeopatía.

Vía sublingual.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No tome oscillococcinum envase unidosis para glóbulos si es alérgico a Anas barbariae o a alguno de los demás componentes de este medicamento

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar oscillococcinum envase unidosis para glóbulos.

Otros medicamentos y oscillococcinum envase unidosis para glóbulos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Toma de oscillococcinum envase unidosis para glóbulos con alimentos y bebidas

Tomar oscillococcinum envase unidosis para glóbulos preferiblemente alejado de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.