

## KNEIPP DELGAPLANT INFUSION 40 BOLSITAS

40 BOLSITAS

Calificación: Sin calificación

**Precio**

10,32 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [BOEHRINGER INGELHEIM](#)

Descripción

**ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN**

Efecto laxante estimulante por parte de la frágula y del sen.

Estos heterósidos antraquinónicos aumentan la motilidad intestinal, dando lugar a un aumento en la eliminación de agua y electrolitos. El efecto laxante se manifiesta a las 8-12 horas después de su administración.

**INGREDIENTES**

Por toma diaria:

Rhamnus frangula (frágula, corteza) 525 mg

Cassia angustifolia (sen, hojas) 450 mg

Mentha x piperita (menta, hojas) 210 mg

Hibiscus sabdariffa (hibiscus, flores) 120 mg

Camellia sinensis (té negro, hojas) 75 mg

Solidago virgaurea (vara de oro, sumidades floridas) 75 mg

Levisticum officinale (levístico, raíz) 45 mg

**MODO DE EMPLEO**

Poner en infusión una bolsita con agua hirviendo. Dejar en infusión durante 10 minutos en una taza cubierta y después endulzar según el gusto. Se recomienda tomar una infusión al día.

**CONTRAINDICACIONES**

- Hipersensibilidad a cualquier componente del producto.

- Situaciones en las que el tránsito gastrointestinal se encuentre dificultado o impedido, como obstrucción intestinal, que podría ser agravada. Este producto podría enmascarar un cuadro más grave si se utiliza en caso de dolor abdominal de origen desconocido sin un diagnóstico preciso.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Antes de iniciar un tratamiento con laxantes estimulantes, el paciente debe estar correctamente hidratado y sus niveles de electrolitos deben ser los normales. Nunca se debe iniciar un tratamiento si el paciente presenta una disminución importante de los niveles de estos electrolitos, ya que se podría agravar la carencia.

Este producto no debe ser utilizado por pacientes con obstrucciones intestinales o enfermedades inflamatorias intestinales.

- Su uso continuado puede provocar habituamiento.
- No se recomienda el uso de este producto durante un periodo de más de 1 a 2 semanas debido a que puede producir dependencia y habituamiento, y potenciar el estreñimiento ya que provoca pérdida de potasio y puede originar atonía intestinal.
- Si al cabo de este período de tiempo, el estreñimiento no mejora, persiste o empeora, se debe consultar al médico o farmacéutico.
- Se debe avisar al médico si aparecen heces con sangre.
- Se recomienda tomar este producto por la noche, y si fuese necesaria una segunda dosis, a primera hora de la mañana.
- Se recomienda que los pacientes ancianos comiencen con la mitad de la dosis de los adultos.

Este producto no debe usarse en niños menores de 2 años sin un diagnóstico preciso ya que podría enmascarar un cuadro más grave.

Por lo general, los laxantes también deben usarse con precaución en niños menores de 12 años. Debe realizarse un diagnóstico adecuado antes de usar este producto para evitar complicaciones de una enfermedad existente, como en caso de apendicitis, o la aparición de efectos secundarios más graves.

### **CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD**

Mantener en lugar fresco y seco, lejos de una fuente de calor.

### **USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA**

Este producto lo puede tomar una persona celíaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.

### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.