

## OPTIBEN OJOS SECOS GOTAS 10 ML

10 ML

Calificación: Sin calificación

**Precio**

6,14 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [CINFA](#)

Descripción

**ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN**

Las propiedades hidratantes y protectoras del hialuronato sódico alivian la irritación, sequedad, abrasión y sensación de cuerpos extraños debidos a elementos ambientales tales como el viento, sol, aire seco, agua salada, humo, luz excesiva, aire acondicionado, calefacción, trabajo prolongado ante el ordenador u operación ocular, conjuntivitis, uso de lentes de contacto.

**INGREDIENTES**

Composición: Hialuronato sódico 0,2%, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico monobásico, cloruro sódico, cloruro de benzalconio, EDTA disódico, agua para inyección.

**MODO DE EMPLEO**

Depositar 1 ó 2 gotas en el párpado inferior y parpadee varias veces para que todo el ojo quede cubierto por el líquido.

Aplíquese cuando lo necesite.

**CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

Cuando se usa de la forma recomendada no causa efectos adversos ni tiene contraindicaciones conocidas.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

No usar si el frasco está dañado.

No usar si eres sensible a cualquiera de los componentes.

No utilice el colirio después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

No toque el párpado ni la superficie del ojo con la punta del envase.

Tire la solución que no haya utilizado inmediatamente después de abrir el envase.

No reutilice un envase de un solo uso abierto.

Después de la administración, en casos poco frecuentes, puede producirse ligera imagen borrosa temporal debido a la viscosidad de la solución. Se recomienda esperar unos segundos antes de realizar cualquier actividad que requiera visión clara.

Retire las lentes de contacto antes de usar optibén ojos secos 10 ml y espere 15 minutos antes de volver a ponérselas. Una vez abierto el frasco tirar todo la solución que no haya sido utilizada después de 30 días.

Dejar un periodo de tiempo de al menos 10 a 15 minutos hasta la administración de otra especialidad oftalmológica.

Una vez abierto el frasco, tirar toda la solución que no haya sido utilizada después de 30 días.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No tragar.

Consérvese a temperatura inferior a 25°C. No administrar al mismo tiempo que otros colirios.

### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.